



Universidad de la República
Uruguay



Banco Interamericano
de Desarrollo

CAMBIANDO
EL MUNDO,
RÁPIDO

Sesión ECHO Manejo Materno-neonatal

Dr. Juan Dapuzo
Dra. Mariana Guirado

Historia clínica

Paciente de 22 años sexo femenino. Cursó hasta segundo año de enseñanza secundaria. Ama de casa. Unión estable. Vive con su pareja y su hijo de 3 años. Derivada desde policlínica a Centro de Referencia cursando embarazo de 32 semanas de edad gestacional.

Antecedentes familiares de HTA

Antecedentes personales de tabaquismo leve.

Pareja de sexo masculino, 34 años, primaria completa, trabajo informal en la construcción. Tabaquista, desconoce otros antecedentes.

AGO: 1 embarazo hace 3 años bien tolerado y controlado.

Parto vaginal término. RN sano de sexo masculino de 3240 g.

Historia clínica

Actualmente cursa embarazo no buscado de 32 semanas de edad gestacional. Captación tardía (28 semanas de EG).

Enviada por resultados de exámenes de laboratorio que evidencian VDRL 32 de unidades, TPHA positivo y serología VIH ELISA reactiva (primera muestra).

Ecografía obstétrica pendiente.

¿Que información le parece adecuado transmitir a la paciente respecto a los resultados actuales?

¿Cuándo, dónde y cómo haría esta comunicación?

¿Qué otra información es necesario dar?



HUB
ECHO
CEDIA
MANEJO MATERNO
NEONATAL

cedia

SESIÓN **ECHO** MANEJO MATERNO NEONATAL

TEMA: "Comunicaciones de
malas noticias"

mie **05** oct

Transmisión
VIA **zoom**



cedia



Historia clínica

Se informa a la paciente de resultados de exámenes obtenidos y de características, tratamiento y pronóstico.
Se obtienen muestras para exámenes de confirmación de la infección por VIH.

Se inicia tratamiento con penicilina benzatínica intramuscular y con comprimidos de tenofovir/lamivudina/dolutegravir vo.
Se coordina seguimiento clínico y con ecografía obstétrica.